


СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ВООП
УПРАВЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА КРАЙИСПОЛКОМА
СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙКОМ ВЛКСМ
ТЕБЕРДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

21 - 23 апреля 1989 г.



Ставрополь, 1989

УДК 598.2

Тезисы докладов "Орнитологические ресурсы Северного Кавказа",
-Ставрополь, 1989, с. 160.

В сборнике помещены тезисы докладов, посвященных различным видам птиц. В них отражены исследования по экологии птиц, их географическому распространению, численности. Уделено внимание редким (краснокнижным) видам. В ряде работ описываются изменения авифауны под влиянием хозяйственной деятельности человека.

Сборник рассчитан на широкий круг читателей-специалистов в области охраны природы, охотоведов, зоологов, преподавателей и студентов.

Издается по решению Ставропольского краевого совета ВООП

Редакционная коллегия: канд. биол. наук А. Н. Хохлов (отв. ред.),
канд. биол. наук Н. Н. Поливанова, асп. Л. В. Афанасова, З. И. Хохлова

© Ставропольский краевой совет ВООП, 1989

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАУНЫ КУРООБРАЗНЫХ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР

Т.Ю.Точиев, И.И.Гизатулин

Чечено-Ингушский госуниверситет им. Л.Н.Толстого

Наблюдения проведены в 1980-88г.г. в различных районах Чечено-Ингушетии.

Перепел. В прошлом перепел водился во множестве на всем пространстве Кавказа (Богданов 1879). В последнее время существует как общая тенденция к снижению гнездящихся птиц, (Потапов, 1987), так, в частности и на Северном Кавказе (Казаков, 1982).

В пределах Чечено-Ингушетии это обычная птица, населяющая открытые пространства равнин, предгорий и гор, поднимаясь до высот 2500 - 2800 м н.у.м.

Наибольшая плотность перепела отмечена в равнинной части республики на полях злаковых культур, где на километровый маршрут приходится в среднем 7-8 особей. На субальпийских лугах у подножия Столовой горы (1500 м н.у.м.) в мае-июле отмечается 1-2 птицы. Еще

реже встречается перепел в бурюнных степях Терско-Кумской низменности (в среднем 0,4 особи на I км маршрута). Здесь он, как правило, заселяет более сырые, задернованные участки по понижениям рельефа.

Наиболее ранняя весенняя встреча перепела приходится на 6 апреля 1984 г. в районе ст. Старогладовской. Наиболее поздняя встреча осенью отмечена здесь же 8 ноября 1982 г.

Куропатка серая. В пределах Чечено-Ингушетии как и в других районах Северного Кавказа (Моламусов, 1966; Степанян, 1975; Комаров, 1988) встречаются две формы этих птиц - равнинная и горная.

Основная масса серой куропатки сосредоточена в полупустынной и степной зонах, где для нее имеются в достаточном количестве подходящие местообитания - задернованные участки с густой травянистой растительностью и наличием древесно-кустарниковых формаций. Однако, численность серой куропатки на равнине в результате нарушения стадий и чрезмерной охоты была подорвана. По этой причине организован Степной заказник. В настоящее время в бурюнных степях Шелковского района на трехкилометровых маршрутах в мае-июне в среднем встречается I-2 пары (Точиев, Гизатулин, 1988). В горных районах, несмотря на гораздо меньшую степень отрицательных воздействий, численность её намного ниже, чем на равнине. Так, на субальпийских лугах в районе сел Итум-Кале, Харачой (около 1500 м н.у.м.) на пять километров встречается в среднем I птица.

21 мая 1988 г. в бурюнах в районе ст. Старогладовской найдено гнездо куропатки с кладкой из 12 свежих яиц. 18 молодых подметков встречено здесь 16 июня 1982 г., а выводок из 16 поршков 5 июля 1983 г.

В зимнее время к местным популяциям могут присоединяться птицы, гнездящиеся за пределами республики в бассейне Волги (Житков, Бутурлин, 1906; Осмоловская, 1966). Заметных изменений в численности куропатки в это время мы не наблюдали. В Шелковском районе 9 ноября 1982 г. отмечено 6 взрослых куропаток, а 30 января 1983 г. стайка из 9 птиц.

Кеклик. Обычная, но немногочисленная оседлая птица, населяющая сухие склоны и ущелья горных рек от предгорий вверх до 3500 м н.у.м.

Предпочтение оказывает местам с выходами скал и осыпей с на-

личиём отдельных куртин можжевельника, шиповника и астроголов. Численность кеклика в 80-х годах, даже по сравнению с 70-ми резко сократилась. В первом случае, в ущелье долины реки Чанты-Аргун мы наблюдали стайки в 30-40 и более птиц довольно часто, тогда как теперь это исключительная редкость. В настоящее время в горных районах республики становится больше факторов беспокойства, исходящих непосредственно от человека.

Кавказский улар. Гнездящаяся, оседлая птица. В летнее время населяет высокогорье от альпийских лугов до границы снега. Предпочитает места с большим количеством скал, осыпей и оврагов, перемежающихся с небольшими участками травянистой растительности.

Наши наблюдения, относящиеся к верховьям рек Армхи, притокам реки Чанты-Аргун показали, что улар в настоящее время везде малочислен. Птицы чаще выдают себя своеобразным свистом. Более 3-5 особей вместе наблюдать не удалось. Специальная охота на этих птиц, даже браконьерская, здесь не практикуется.

Северо-Кавказский фазан. В прошлом в пойме Терека это была обычная, многочисленная птица (Богданов, 1879). В середине 50-х годов численность его на Северном Кавказе была подорвана до минимальной. Так, в районе Махачкалы, Моздока и Грозного было отмечено всего 35 птиц (Моламусов, 1966).

За последние 5-6 лет успехи в восстановлении численности фазана в республике, особенно в Шелковском районе налицо. Он обычен в таких заказниках как Старо-Сунженский, Парабочевский, в окрестностях озер Будары. В пойменных лесах по Тереку в районе станции Ищерская, Червленая, Старогладовская на трехкилометровых маршрутах отмечалось 3-5 особей этих птиц. В районе озер Будары ежегодно гнездится 6-9 пар (Точиев, Гизатулин, 1988). На численность фазана в республике, кроме прочих факторов, большое влияние оказывают хищные млекопитающие. Так, анализ содержимого 32 желудков шакала из Старо-Сунженского заказника показал наличие остатков фазана в 28 % желудков. Встречался фазан и в желудках обыкновенной лисицы и лесного кота (Точиев, 1970).

Птенцы фазана в Старо-Сунженском заказнике появляются в конце мая - начале июня. Количество птенцов в выводке ($n=4$) в среднем составляет 8,5. Смертность птенцов достигает 30 % (Осмоловская, 1959). В районе Кизляра выводки держатся до начала сентября. (Беме, 1925).

31 мая 1987г. в тростниках озера Будары найдена кладка фазана из 12 яиц средней насиженности. Поршки, держащиеся в зарослях тамарикса и ежевики встречались здесь 25 июня 1984 г., 30 июня 1984 г. и 20 июля 1987г. в количестве 7,7 и 9 птенцов соответственно. Во всех случаях вместе с выводками находились самки.

Кавказский тетерев. Гнездящаяся, оседлая птица. Населяет альпийский пояс всей горной части республики. Наши наблюдения касаются Скалистого хребта в районе Столовой горы, верховьев рек Армхи и Шан.

Гнездования тетеревов приурочены, как правило, к зарослям березового криволеся, рододендрона, можжевельника либо располагаются просто под крупными камнями или другими естественными укрытиями. В августе-сентябре небольшие стайки этих птиц кочуют по ягодным местам. Утверждать, что численность тетерева меньше чем у лара, затруднительно. Мы отмечали здесь стайки в 9-11 птиц. Часты встречи и с одиночными особями. В осенне-зимнее время тетерев обычен в верхней границы леса.

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Абуладзе А.В. 3 | Мнацеканов Р.А. 94 |
| Афанасова Л.В. 6 | Мусаев А.М. 80 |
| Белик В.П. 8, 13, 36 | Мухтаров Х.Ш. 86 |
| Беньковская И.Л. 7 | Нечаев В.Б. 13 |
| Беньковский Л.М. 7 | Нечаев И.Б. 13 |
| Битаров В.Н. 84 | Пишванов Ю.В. 71 |
| Бичерев А.П. 18 | Плотников Г.К. 70 |
| Ветров В.В. 13 | Поливанов В.М. 68 |
| Витович О.А. 25 | Поливанова Н.Н. 68 |
| Гизатуллин И.И. 27, 30, 95 | Прилуцкая Л.И. 71 |
| Емтыль М.Х. 70 | Самородов Ю.А. 74 |
| Исрафилов С.А. 34 | Скиба С.Б. 85 |
| Казаков Б.А. 36 | Сотникова Е.И. 76 |
| Комаров Ю.Е. 40 | Спасская Т.Х. 77 |
| Константинов В.М. 46 | Султанов Э.Г. 80, 86 |
| Кривенко В.Г. 62 | Тельпов В.А. 84 |
| Куприна Е.И. 94 | Тильба П.А. 90, 93 |
| Линьков А.Б. 60, 62 | Тимофеев А.Н. 84 |
| Маландзия В.И. 65 | Точиев Т.Ю. 30, 95 |
| Метелева О.Н. 94 | Хохлов А.Н. 18, 46, 98, 101, 106 |

Дополнение:

- Бутъев В.Т. 137
 Коблик Е.А. 137
 Костин А.Б. 137
 Михеев А.В. 137
 Хохлов А.Н. 152

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Тезисы докладов научно-практич. конференции

Ответственный редактор кандидат биологических наук А.Н.Хохлов

Подписано к печати 5/01-1989. ВГ- 29501 Формат 60x84 / 16

Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 9,5. Уч. изд. л. 10,0 Тираж 200.

Заказ **444** Цена 1 руб.

отпечатано в отделе оперативной печати
Ставропольского краевого управления статистики
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4